

分類	主訴	チェック	CRS	インフレーション リアクション	血液障害	甲状腺 機能亢進	甲状腺 機能低下	下垂体 機能低下	副腎 機能低下	1型糖尿病	眼障害	肺障害	心臓障害	下肢 血栓・塞栓	下痢・腸炎	肝障害 胆管炎	膵炎	腎障害	筋・骨格 障害	脳・神経 障害	皮膚障害	
全身症状	倦怠感・疲労	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>			
	発熱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	発汗	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>														<input type="checkbox"/>		
	悪寒	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	<input type="checkbox"/>	
	頭痛	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	口渇	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	浮腫	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
眼	視覚異常	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
呼吸器	咳	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								
	息切れ・呼吸困難	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		
循環器	動悸・脈拍変化	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
消化器	悪心・嘔吐 食欲不振	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	下痢	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>							
	血便・粘液便	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>							
	腹痛	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
泌尿器	多尿・頻尿	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>				
	乏尿・無尿	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
筋・神経	筋肉痛・関節痛	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	しびれ	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>															<input type="checkbox"/>		
	体に力が入らない	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	眼瞼下垂	<input type="checkbox"/>																	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
皮膚・粘膜	発疹・水疱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																<input type="checkbox"/>	
	黄疸・皮膚変色	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	

引用元書籍：薬剤師のためのirAEハンドブック 見逃さない、決めつけない、後手に回らないために（中外医学社）

※ICI報告書について

ICI治療で起こるirAE（免疫関連有害事象）による死亡や重症化の防止のためには、irAEを早期に発見、治療することが重要です。

皮膚・消化器・内分泌系・神経系などあらゆる全身臓器に炎症性の免疫反応が発現し、irAEの発症時期は一定ではなく投与中止後も症状の持続や新たなirAEが発症することがあります。

ICI治療終了後1年間は晩期副作用発現の要注意期間とし、かかりつけ薬局への来局時に体調変化の有無やその程度を薬剤師が確認し、ICI治療を実施した医療機関へ情報提供することで継続的なフォローを可能にし、有害事象を早期に発見することを目的とします。

この対応表の項目はICI報告書の項目にある症状や主訴から想定される疾患の例で、すべてではありません。詳しくは引用元書籍等をご参照ください。